

المراجعة النهائية
ملخص أهم قوانين
الرياضيات

الصف الثاني الثانوي
الفصل الدراسي الثاني

مكتبة توجيه الرياضيات
أ. عادل إمام

أولاً : الجبر

المتابعة

هي دالة مجالها مجموعة الأعداد الصحيحة الموجبة $\mathbb{N}^+$ و مجالها المقابل مجموعة الأعداد الحقيقية $\mathbb{R}$ (د : $\mathbb{N}^+ \rightarrow \mathbb{R}$)

المتابعة المنتهية و المتابعة غير المنتهية

✳ تكون المتابعة منتهية إذا كان عدد حدودها منتهياً (أى يمكن حصره أو عده)

✳ تكون غير منتهية إذا كان عدد حدودها غير منته (عدد لا نهائى من العناصر)

المتابعة التزايدية و المتابعة التناقصية و المتابعة الثابتة

✳ المتابعة التزايدية : $u_{n+1} - u_n > 0$ < الصفر

✳ المتابعة التناقصية : $u_{n+1} - u_n < 0$ > الصفر

✳ المتابعة الثابتة : $u_{n+1} - u_n = 0$ = الصفر

المتسلسلات و رمز التجميع

الخواص الجبرية للتجميع

إذا كانت (u_n) ، (v_n) متتابعتين ، $n \in \mathbb{N}^+$ ، $u \in \mathbb{R}$ ، فإن :

$$① \quad \sum_{n=1}^p u_n = u \quad \text{عندما } u = 0$$

$$② \quad \sum_{n=1}^p u_n \cdot p = p \cdot \sum_{n=1}^p u_n$$

$$③ \quad \sum_{n=1}^p u_n \pm \sum_{n=1}^p v_n = \sum_{n=1}^p (u_n \pm v_n)$$

$$④ \quad \text{قانون مجموع الأعداد الصحيحة : } \sum_{n=1}^p n = \frac{(1+p)p}{2}$$

$$⑤ \quad \text{قانون مجموع مربعات الأعداد الصحيحة : } \sum_{n=1}^p n^2 = \frac{(1+p^2)(1+p)p}{6}$$

ملاحظات على المتتابعات الهندسية

يمكن إيجاد مجموع عدد غير منته من حدود متتابعة هندسية إذا فقط إذا كان:

$$|r| < 1 \text{ أي: } -1 < r < 1 \text{ ويكون: } \frac{p}{r-1} = \infty$$

العلاقة بين الوسطين الحسابي والهندسي

نظرية: الوسط الحسابي لعدد حقيقيين موجبين مختلفين أكبر من وسطهما الهندسي.

أي أنه لأي عددين s, r حيث $s, r \in \mathbb{R}^+$ ، $s \neq r$

$$\text{يكون: } \frac{s+r}{2} < \sqrt{s \cdot r}$$

أي أن الوسط الحسابي أكبر من الوسط الهندسي الموجب، ولما كان الوسط الهندسي الموجب أكبر من الوسط الهندسي السالب فإن الوسط الحسابي يكون أكبر من الوسط الهندسي (على الإطلاق).

ملاحظات

إذا كان s, r, e ثلاثة أعداد في تتابع حسابي فإن: r وسط حسابي بين s, e

$$\text{ويكون: } \sqrt{s \cdot e} < r$$

إذا كان s, r, e ثلاثة أعداد في تتابع هندسي فإن: r وسط هندسي بين s, e

$$\text{ويكون: } \frac{s+e}{2} < r$$

مبدأ العد - التباديل - التوافق

مبدأ العد

إذا أمكن إجراء عمل ما بطرق عددها m ، و عمل آخر بطرق عددها n ، فإنه يمكن إجراء العاملين معاً بطرق عددها $m \times n$

مضروب العدد

مضروب العدد الصحيح الموجب n يكتب بالصورة: $n!$ هو يساوي حاصل ضرب جميع الأعداد الصحيحة الأقل من أو تساوي n

$$\text{أي أن: } n! = n(n-1)(n-2) \dots \times 3 \times 2 \times 1$$

ملاحظات

عدد عوامل $n!$ يساوي n عامل أكبرها n و أصغرها الواحد الصحيح.

$$n! = n(n-1)(n-2) \dots (1-n) = (1-n)! \quad n = 1 \quad n = 2 \quad n = 3$$

أي أن مضروب العدد = العدد $\times$ مضروب (العدد - 1)

$$1! = 1 \quad \text{الصفحة} = 1 \quad \text{و العكس صحيح إذا كان: } 1 = s \text{ فإن } s = 0, 1$$

يمكن استخدام الحاسبة العلمية لحساب مضروب العدد فمثلاً لحساب $5!$

$$\text{نكتب: } [5] \text{ shift } [x^{-1}] \text{ يظهر لنا على الشاشة "5!" ثم بالضغط على } [=]$$

نجد أن الناتج يساوي 120 (أي: $5! = 120$)

☺ عدد طرق ترتيب n من الأشياء في صف $|n|$
 ☺ عدد طرق ترتيب n من الأشياء في دائرة $|n-1|$

التباديل

يرمز لعدد n من التباديل المتميزة مأخوذ منها r من العناصر في كل مرة بالرمز ${}^n P_r$
 حيث : ${}^n P_r = n(n-1)(n-2)\dots(n-r+1)$
 $r \geq 0, n \geq r, r \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}^+$

ملاحظات

☺ أي أن : ${}^n P_r$ تعني حاصل ضرب الأعداد الصحيحة الموجبة التي عددها r و أكبرها n ، و أصغرها $(n-r+1)$

$$\text{☺ } {}^n P_r = \frac{|n|}{|n-r+1|} = \frac{|n|}{|n-r+1|} = \frac{|n|}{|n-r+1|}$$

☺ يمكن استخدام الحاسبة العلمية لحساب التباديل فمثلا لحساب : ${}^n P_r$

نكتب : $[8] \text{ shift } [3] \times$ يظهر لنا على الشاشة " $8P3$ " ثم بالضغط على [=] نجد أن الناتج يساوي ٣٣٦ ($\therefore {}^n P_r = 336$)

التوافيق

هي كل مجموعة يمكن تكوينها من مجموعة من الأشياء بأخذ بعضها أو كلها بصرف النظر عن ترتيبها .

أي أن : ${}^n C_r$ هو عدد التوافيق المكون كل منها من r من الأشياء المختارة من بين n من العناصر حيث ، $r \geq 0, n \geq r, r \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}^+$

ملاحظات

$$\text{☺ } {}^n C_r = \frac{|n|}{|r|} = \frac{|n|}{|r|} = \frac{|n|}{|r|}$$

$$\text{☺ } {}^n C_r = {}^n C_{n-r} \text{ " قانون التبسيط"}$$

$$\text{☺ إذا كان : } {}^n C_r = {}^n C_{n-r} \text{ فإن : } r = n-r, \text{ أو } r = n-r$$

" إذا كان العلم = العلم الدليل فإن إما : الدليل = الدليل أ ، مجموع الدليلين = العلم "

☺ يمكن استخدام الحاسبة العلمية لحساب التوافيق فمثلا لحساب : ${}^n C_r$

نكتب : $[7] \text{ shift } [2] \div$ يظهر لنا على الشاشة " $7C2$ " ثم بالضغط على [=] نجد أن الناتج يساوي ٢٦ ($\therefore {}^n C_r = 26$)

ثانياً: النفاضل و التكامل

التغير

إذا كانت: $ص = د(س)$ وتغيرت $س$ من $س$ إلى $س + هـ$ فإن $ص$ تتغير تبعاً لذلك من $د(س)$ إلى $د(س + هـ)$ وعلى ذلك فإن التغير في $ص$ يكون $د(س + هـ) - د(س)$ والذي يرمز له بالرمز $ت(هـ)$ أي أن :

$$\textcircled{\smile} \text{ دالة التغير } ت(هـ) = د(س + هـ) - د(س)$$

$$\textcircled{\smile} \text{ دالة متوسط التغير } م(هـ) = \frac{ت(هـ)}{هـ} = \frac{د(س + هـ) - د(س)}{هـ}$$

$$\textcircled{\smile} \text{ دالة معدل التغير } ذ(س) = \lim_{هـ \rightarrow 0} م(هـ) = \lim_{هـ \rightarrow 0} \frac{د(س + هـ) - د(س)}{هـ}$$

تذكر أن

- (١) مساحة الدائرة = $\pi ر^2$ ، محيط الدائرة = $2\pi ر$
- (٢) مساحة المربع = $ل^2$ ، محيطه = $4ل$
- (٣) مساحة المستطيل = الطول $\times$ العرض ، محيطه = $2(الطول + العرض)$
- (٤) مساحة المكعب الكلية = $6ل^2$ ، المساحة الجانبية = $4ل^2$ ، حجم المكعب = $ل^3$
- (٥) مساحة الكرة = $4\pi ر^2$ ، حجم الكرة = $\frac{4}{3}\pi ر^3$
- (٦) مساحة المثلث = نصف حاصل ضرب طولي ضلعي $\times$ جيب الزاوية المحصورة بينهما

الإشتقاق:

إذا كانت $ص = د(س)$

المشتقة الأولى للدالة $د$ بالنسبة إلى $س$ يرمز لها بأحد الرموز الآتية :

$$\frac{دص}{دس} = ص' = د'(س) = \frac{د(س + هـ) - د(س)}{هـ}$$

ملاحظة هامة :

المشتقة الأولى لدالة عند نقطة = ميل المماس لمنحنى الدالة عند هذه النقطة = ظل الزاوية الموجبة التي يصنعها المماس لمنحنى الدالة عند هذه النقطة = معدل تغير الدالة عند هذه النقطة .

$$\text{أي أن : } \frac{دص}{دس} = ص' = د'(س) = \frac{د(س + هـ) - د(س)}{هـ} = م = \text{ظا هـ}$$

قابلية الاشتقاق :

يقال أن الدالة " د " قابلة للاشتقاق عند $s = p$ حيث $p \in$ مجال الدالة " د " : إذا و فقط إذا كانت : $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{d(p+h) - d(p)}{h}$ (لها وجود)

قابلية للاشتقاق للدالة متعددة التعريف (المشتقة اليمنى و اليسرى)

إذا كانت $s = p$ نقطة تنتمي لمجال الدالة " د " و كان قاعدة الدالة عند $s < p$ تختلف عن قاعدتها عند $s > p$ (في جوار p). فعند بحث قابلية الاشتقاق عند $s = p$ يجب بحث المشتقة اليمنى $d^+(p)$ ، و المشتقة اليسرى $d^-(p)$ والمقارنة بينهما حيث :

$$d^+(p) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{d(p+h) - d(p)}{h}, \quad d^-(p) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{d(p+h) - d(p)}{h}$$

فإذا كان : $d^+(p) = d^-(p)$ فإن الدالة د تكون قابلة للاشتقاق عند $s = p$

ملاحظات :

- (١) كل دالة غير متصلة عند نقطة تكون غير قابلة للاشتقاق عند نفس النقطة .
- (٢) الدالة المتصلة عند نقطة ليس من الضروري أن تكون قابلة للاشتقاق عند نفس النقطة . أي أن اتصال الدالة عند نقطة شرط ضروري و لكنه غير كاف لقابلية اشتقاق الدالة عند ذات النقطة .
- (٣) كل دالة قابلة للاشتقاق عند نقطة تكون متصلة عند نفس النقطة .
- (٤) إذا كانت الدالة غير قابلة للاشتقاق عند نقطة فإنه ليس من الضروري أن تكون متصلة عند نفس النقطة .

هام جداً :

إذا كانت الدالة د قابلة للاشتقاق عند $s = p$ فإن :

$$(١) \text{ الدالة متصلة عند } s = p \iff d^-(p) = d^+(p) = d(p)$$

$$(٢) d^-(p) = d^+(p)$$

قواعد الاشتقاق

$$(١) \text{ إذا كانت } s = p \text{ حيث } p \text{ ثابت فإن } \frac{ds}{ds} = \text{صفر}$$

$$(٢) \text{ إذا كانت } s = p \text{ فإن } \frac{ds}{ds} = p \times s^{p-1}$$

$$(٣) \frac{ds}{ds} (u \pm v) = \frac{ds}{ds} u \pm \frac{ds}{ds} v \text{ (مشتقة مجموع دالتين)}$$

$$(٤) \text{ إذا كانت } r = \sqrt{d(s)} \text{ فإن } \frac{\text{مشتقة ما تحت الجذر}}{2 \times \text{الجذر}} = \frac{ds}{ds}$$

$$(٥) \text{ إذا كانت } r = d(s) \cdot u \text{ فإن } \frac{ds}{ds} = d \cdot u + u \cdot d \cdot u$$

أي أن مشتقة حاصل ضرب دالتين = مشتقة الأولى × الثانية + الأولى × مشتقة الثانية

$$(٦) \text{ إذا كانت } r = \frac{d(s)}{u(s)} \text{ فإن } \frac{ds}{ds} = \frac{d \cdot u - u \cdot d}{u^2(s)}$$

أي أن مشتقة خارج قسمة دالتين

$$= (\text{مشتقة البسط} \times \text{المقام} - \text{مشتقة المقام} \times \text{البسط}) \div \text{مربع المقام}$$

$$(٧) \text{ إذا كانت } r = [d(s)]^n \text{ فإن } \frac{ds}{ds} = n [d(s)]^{n-1} \times d(s)$$

أي أن مشتقة (قوس) n = (القوس) $n-1$ × مشتقة ما بداخل القوس

$$(٨) \text{ إذا كانت } r = \sin d(s) \text{ فإن } \frac{ds}{ds} = \cos d(s) \times d(s)$$

$$(٩) \text{ إذا كانت } r = \cos d(s) \text{ فإن } \frac{ds}{ds} = -\sin d(s) \times d(s)$$

$$(١٠) \text{ إذا كانت } r = \tan d(s) \text{ فإن } \frac{ds}{ds} = \sec^2 d(s) \times d(s)$$

$$(١١) \text{ قاعدة السلسلة : إذا كانت } r = f(g) \text{ فإن } \frac{ds}{ds} = \frac{ds}{dg} \times \frac{dg}{ds}$$

تذكر أن :

ميل الخط المستقيم :

$$\text{②} \quad m = \frac{\text{فرق الصادات}}{\text{فرق السينات}} = \frac{\text{معامل } s}{\text{معامل } s} = \text{ظاهر}$$

$$\text{③} \quad \text{ميل المستقيم الموازي لمحور السينات} = \text{صفر}$$

$$\text{④} \quad \text{ميل المستقيم الموازي لمحور الصادات غير معرف} = \frac{1}{\text{صفر}}$$

$$\text{⑤} \quad \text{إذا كان } l_1 \parallel l_2 \text{ فإن } m_1 = m_2$$

$$\text{⑥} \quad \text{إذا كان } l_1 \perp l_2 \text{ فإن } m_1 \times m_2 = -1$$

$$\text{⑦} \quad \text{للحصول على نقط تقاطع المنحنى مع محور السينات : بوضع } s = 0$$

$$\text{⑧} \quad \text{للحصول على نقط تقاطع المنحنى مع محور الصادات : بوضع } s = 0$$

$$\text{⑨} \quad \text{للحصول على نقط تقاطع منحنين : نقوم بحل معادلتيهما جبرياً}$$

معادلة المماس و العمودى عليه لمنحنى الدالة :

☺ معادلة المماس : $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ حيث (x_1, y_1) نقطه على المماس ، $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$

☺ معادلة العمودى : $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ حيث (x_1, y_1) نقطه على العمودى ، $m = -\frac{1}{\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}}$

التكامل

☒ $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$

☒ $\int (ax+b)^n dx = \frac{(ax+b)^{n+1}}{(n+1)a} + C$

☒ $\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$

☒ $\int \frac{1}{x^2} dx = -\frac{1}{x} + C$

☒ $\int \frac{1}{x^3} dx = -\frac{1}{2x^2} + C$

☒ $\int \frac{1}{x^4} dx = -\frac{1}{3x^3} + C$

ثالثاً : حساب المثلثات

تذكر أن :

العلاقات الأساسية بين النسب المثلثية

$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ $\tan^2 \theta + 1 = \sec^2 \theta$ $1 = \cot^2 \theta + \csc^2 \theta$

$\frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \tan \theta$

$\frac{\cos \theta}{\sin \theta} = \cot \theta$

مقلوبات النسب المثلثية الأساسية :

$\frac{1}{\sin \theta} = \csc \theta$

$\frac{1}{\tan \theta} = \cot \theta$

$\frac{1}{\sec \theta} = \cos \theta$

قاعدة الجيب : في المثلث : $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$ يكون $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$

قاعدة جيب التمام : $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$ ، $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$ ، $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$


$$\frac{a^2 - b^2 - c^2}{-2bc} = \cos A$$

زوايا الارتفاع و زوايا الانخفاض



إشارات الدوال المثلثية

انظر الشكل التالي:



الدوال المثلثية لمجموع و الفرق بين قياسى زاويتين

$$\sin(A+B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B$$

$$\sin(A-B) = \sin A \cos B - \cos A \sin B$$

$$\cos(A+B) = \cos A \cos B - \sin A \sin B$$

$$\cos(A-B) = \cos A \cos B + \sin A \sin B$$

$$\frac{\sin A - \sin B}{\cos A + \cos B} = \tan \frac{A-B}{2}$$

$$\frac{\sin A + \sin B}{\cos A - \cos B} = \tan \frac{A+B}{2}$$

الدوال المثلثية لضعف قياس الزاوية

$$\begin{aligned} \text{جا } 2\alpha &= 2\text{جا } \alpha \cos \alpha \\ \text{جتا } 2\alpha &= \text{جتا } \alpha^2 - \text{جا } \alpha^2 = 1 - 2\text{جتا } \alpha^2 \\ \frac{\text{ظا } 2\alpha}{\text{جتا } 2\alpha} &= \frac{2\text{ظا } \alpha}{1 - \text{جتا } \alpha^2} \\ \text{وكذلك يمكن اثبات أن :} \\ \text{جا } 3\alpha &= 3\text{جا } \alpha - 4\text{جا } \alpha^3 \\ \text{جتا } 3\alpha &= 4\text{جتا } \alpha^3 - 3\text{جتا } \alpha \\ \frac{\text{ظا } 3\alpha}{\text{جتا } 3\alpha} &= \frac{3\text{ظا } \alpha - 4\text{ظا } \alpha^3}{4\text{جتا } \alpha^3 - 3\text{جتا } \alpha} \end{aligned}$$

الدوال المثلثية لنصف قياس الزاوية

$$\begin{aligned} \text{جا } \frac{\alpha}{2} &= \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{2}} \\ \text{جتا } \frac{\alpha}{2} &= \pm \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{2}} \\ \text{ظا } \frac{\alpha}{2} &= \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{1 + \cos \alpha}} \end{aligned}$$


صيغة هيرون لحساب مساحة المثلث

في المثلث α, β, γ : إذا كان نصف محيط المثلث α, β, γ

$$\frac{\alpha + \beta + \gamma}{2} = \epsilon$$

و تكون مساحة المثلث α, β, γ

$$\Delta = \sqrt{\epsilon(\epsilon - \alpha)(\epsilon - \beta)(\epsilon - \gamma)}$$



طول نصف قطر الدائرة المرسومة داخل المثلث


تذكر ان الدائرة الداخلة لمثلث هي الدائرة التي تمس أضلاع المثلث ، و مركزها هو نقطة تقاطع منصفات زوايا الداخلة .

إذا كان α, β, γ " ع " نصف محيط المثلث α, β, γ

" Δ " مساحة المثلث α, β, γ

، في طول نصف قطر الدائرة الداخلة للمثلث α, β, γ فإن:

$$r = \frac{\Delta}{\epsilon}$$



موقع الدكتور محمد رزق التعليمي



امسح الباركود بالمويل لتثبيت
التطبيق وتحميل كل الملازم مجاناً وبسرعه



حمل التطبيق الآن



كورسات ونتائج امتحانات



ملازم ثانوي



ملازم اعدادي



ملازم ابتدائي



موقع الدكتور محمد رزق
Dr. Mo. RIZK



D.M.RAZK

موقع الدكتور محمد رزق معلم الكيمياء التعليمي